

## BIOPASS LISINA 40 M

### ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ L - ΛΥΣΙΝΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΑ

Η λυσίνη είναι από τα σημαντικότερα αμινοξέα μετά τη μεθειονίνη στη διατροφή των μηρυκαστικών. Πειραματικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι η προσθήκη λυσίνης και η σχέση της με τη μεθειονίνη έχει θετική επίδραση στη μεταβατική περίοδο και στην περιεκτικότητα του γάλακτος σε πρωτεΐνη (Rulquin et al., 1990).

Είναι απαραίτητη η εκτίμηση της ορθής σχέσης μεταξύ των δύο αμινοξέων (Λυσίνη / Μεθειονίνη) για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων σχετικά με την παραγωγή και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος (NRC, 2001).

Η BIOPASS LISINA 40M είναι λυσίνη **προστατευμένη (Biopass)** από την αποικοδόμηση στη μεγάλη κοιλία.

Στα σιτηρέσια με μεγάλη περιεκτικότητα σε καλαμπόκι, που είναι γνωστό ότι είναι φτωχό στο αμινοξύ λυσίνη, συνιστάται κατάλληλη συμπλήρωση με λυσίνη, η δε ανάγκη χορήγησης αποτιμάται σε περίπου 15-30 γραμ./αγελάδα/ημέρα (Rulquin H., Le Henoff L., Verité R., 1990), μέχρι 40 γραμ./αγελάδα/ημέρα σε ορισμένες συνθήκες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της BIOPASS LISINA 40M είναι:

- ✓ Υψηλό επίπεδο προστασίας (Biopass) στη μεγάλη κοιλία
- ✓ Απελευθερώνεται και απορροφάται ολοκληρωτικά στο έντερο
- ✓ Αυξάνει τη ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος
- ✓ Συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κλινικών και υποκλινικών κετώσεων

\*Για προστασία στη μεγάλη κοιλία, τα συστατικά περικλείονται σε μικροκάψουλα με τεχνολογία "Biopass<sup>®</sup>", η οποία αναπτύχθηκε και ανήκει στην Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.

#### Πρόσθετα ανά κιλό

3.2.3. Μονοϋδροχλωρική L-λυσίνη,  
τεχνικά καθαρή\* 400.000 mg  
E321 Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT) 2.000 mg

#### Σύνθεση

Τριγλυκερίδια φυτικής προέλευσης, σάκχαρα  
τεύλων (σακχαρόζη).

#### Αναλυτικά συστατικά %

Ολική πρωτεΐνη	38.2 %
Ολικά έλαια και λίπη	59.6 %
Ολικές ινώδεις ουσίες	0.0 %
Ολική τέφρα	0.0 %
Νάτριο	0.0 %
Λυσίνη	31,6 %

#### Οδηγίες χρήσης

Αναμειγνύεται πλήρως στην τροφή των μηρυκαστικών και των χοίρων στη δοσολογία:

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και βουβάλια: 400 - 600 γρ. για κάθε 100 κιλά ζωτροφής (35 - 40 γρ/κεφαλή / ημέρα).

Πρόβατα και γίδες γαλακτοπαραγωγής: 300-450γρ. για κάθε 100 κιλά συμπληρωματικής ζωτροφής (4-6 γρ. / κεφαλή / ημέρα).

Χοίροι: 100 -150 γρ. για κάθε 100 κιλά ζωτροφής.

#### Περίοδος για κατανάλωση

24 μήνες

#### Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Καθαρό βάρος: 25 κιλά

Παρασκευάζεται από :

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.

a LIVISTO company

Via Affarosa, 4-42010 Rio Saliceto (RE)

Italy

Αριθμός εγγραφής : αIT000013RE